

# القانون الصحي لحيوانات اليايسة - 2019

## الفصل 14.6

### التهاب البربخ في الأغنام

**OVINE EPIDIDYMITIS**  
(العامل المسبب *Brucella ovis*)  
(تقرأ الأرقام من اليسار إلى اليمين)

#### المادة 14.6.1

#### أحكام عامة

توجد معايير الاختبارات التشخيصية واللقاحات في دليل اليايسة Terrestrial Manual.

#### المادة 14.6.2

#### قطيع أغنام خالٍ من التهاب البربخ في الأغنام

للاعترااف بخلو قطيع أغنام من التهاب البربخ في الأغنام يشترط استيفاء التالي:

- 1- أن يكون القطيع موضوعاً تحت إشراف بيطري رسمي؛
  - 2- ألا يكون قد ظهرت في القطيع أية أعراض سريرية لالتهاب البربخ منذ سنة على الأقل؛
  - 3- أن تعطى هوية تعريفية دائمة لجميع أغنام القطيع؛
- في حال اعتماد التحصين ضد هذا المرض لجميع ذكور القطيع أو بعضها، يجب الاستمرار في اعتبار القطيع المذكور خالٍ من التهاب البربخ في الاغنام.

#### المادة 14.6.3

توصيات لاستيراد أغنام التوالد أو التربية (دون ذكور مخصية)

يتوجب على السلطات البيطرية عند الاستيراد

طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد التالي:

- 1- أنه لم تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية لالتهاب البربخ في الأغنام؛
- 2- أن الحيوانات واردة من قطيع خالٍ من التهاب البربخ في الأغنام؛
- 3- بالنسبة للأغنام التي يزيد عمرها عن 6 أشهر: أنها عزلت خلال ال 30 يوماً السابقة للشحن في مزرعة المنشأ حيث أخضعت لاختبارات تشخيصية مع نتائج سلبية لالتهاب البربخ في الأغنام، أو
- 4- بالنسبة للأغنام الواردة من قطعان غير مذكورة في البند (2) أعلاه: أنها عزلت قبل الشحن وأخضعت لاختبارين تشخيصيين مع نتائج سلبية لالتهاب البربخ في الأغنام بفواصل 30-60 يوماً بينهما، على أن يُجرى الاختبار الثاني خلال ال 15 يوماً السابقة للشحن.

#### المادة 14.6.4

##### توصيات لاستيراد نطفة الاغنام

يتوجب على السلطات البيطرية عند الاستيراد

طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:

- 1- أن الذكور مصدر النطفة:
  - أ - لم تظهر عليها يوم جمع النطفة أية أعراض سريرية لالتهاب البربخ في الأغنام؛
  - ب- واردة من قطيع أغنام خالٍ من التهاب البربخ في الاغنام؛
  - ج - بقيت خلال ال 60 يوماً السابقة للشحن على أراضي بلد المصدر في مزرعة أو مركز للتلقيح الاصطناعي يضم حيوانات جميعها خالية من التهاب البربخ في الاغنام؛
  - د- أنها أخضعت للاختبارات التشخيصية مع نتائج سلبية لالتهاب البربخ في الاغنام خلال الثلاثين يوماً السابقة لجمع النطفة؛
- 2- إن نطفة الذكور لا تحوي العامل المسبب لمرض *Brucella ovis* أو الأجسام المناعية المضادة له.